



POOPERAČNÍ PÉČE

Umístění zvířete

- Po operaci může přetrvávat u vašeho zvířete ospalost a neochota k pohybu po dobu 24–36 hodin. Po tuto dobu umístěte pacienta na klidné suché místo bez průvanu, s optimální teplotou prostředí 15–25 °C.
- Vždy je lepší mít zvíře pod dohledem v místnosti. Nenechávejte zvíře na vyvýšeném místě – zamezíte tím pádu a poranění.

Kontrola sliznic

- Během 12 hodin po operaci kontrolujte sliznice psa.
- Barva sliznic by měla být růžová až slabě červená.
- Po stlačení tvářové sliznice zmizí barva, její návrat by měl být do dvou až tří sekund.

Voda

- Po příchodu domů (pokud je pacient zcela při vědomí) nabídněte malé množství čerstvé vody, toto proveďte několikrát za hodinu.
- Nenechte vašeho psa vypít velké množství vody najednou – nebezpečí zvracení.
- Neomezený přístup k vodě umožněte za 2–4 hodiny po prvním podání tekutin.

Potrava

- Potravu nabídněte za 5–10 hodin po operaci za předpokladu, že pacient nezvrací.
- Podávejte malé množství stravitelné potravy.
- U štěňat a velmi malých plemen psů začněte podávat potravu co nejdříve.
- K normálnímu stravovacímu režimu přejděte 24 hodin po operaci (pokud neurčí lékař jinak).
- Potrava by měla být stravitelná, bohatá na bílkoviny a energii.

Pohybová aktivita

- Do vytažení stehů výrazně omezte pohyb pacienta.
- Procházky by měly probíhat jen na vodítku a zamezte výskokům a seskokům.

Ochrana operační rány

- Je nutné zabránit olizování operační rány – nebezpečí zavlečení infekce a předčasné odstranění stehů.
- Použijte ochranné límce, ochranné bandáže nebo obleček. Je možné také využít náhubek vypletený z přední strany prodyšným materiálem.

Kontrola operační rány

- Mírný otok, bolestivost a zarudnutí je v prvních dvou dnech normální, z rány nesmí vytékat žádný sekret.
- Po dobu hojení rány psa nekoupejte.
- Stehy se obvykle vytahují za 10–12 dní, neurčí-li lékař jinak.

Tlumení bolesti

- **NEPODÁVEJTE léky určené pro lidi** – nebezpečí žaludečních vředů, selhání ledvin a krvácivých stavů.

KDY KONTAKTOVAT VETERINÁRNÍ LÉKAŘE:

- při prodlouženém probouzení (trvajícím déle než 12 hodin),
- při změně barvy sliznic – šedá, porcelánově bílá,
- pokud se objevilo opakované zvracení,
- pokud pacient odmítá vodu a krmivo déle jak 24 hodin, u štěňat a toy plemen 12 hodin,
- pokud je operační rána oteklá, červená, krvácí nebo prosakuje a mokvá,
- při výskytu větší bolestivosti, nařikání a změn v chování zvířete,
- při kašli.

DŮLEŽITÉ:

- Pokud má pacient na končetině bandáž po kanylaci, odstraňte ji.
- V případě jakýkoliv komplikací vyhledejte ordinaci ošetřujícího lékaře.