

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠTĚNATA V 1. ROCE ŽIVOTA

Vakcinace		
Vakcinace		Datum
1. vakcinace	(6.) 8.–9. týden stáří	
2. vakcinace	9.–12. týden stáří (3–4 týdny po 1. vakcinaci)	
3. vakcinace	12.–16. týden stáří (3.–4. týdny po 1. vakcinaci)	
4. vakcinace	ve stáří 3. – 6. měsíců zákonná vakcinace vztekliny	
5. vakcinace	ve stáří 1 roku	

Odčervení										
Týden po porodu						Měsíc stáří				
2	4	6	8	10	12	4	5	6	9	12
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1. odčervení: 14. den po porodu
 2.–4. odčervení: 14denní interval do 3 měsíců
 5.–7. odčervení: po 1 měsíci do stáří 6 měsíců
 8. odčervení: ve stáří 9 měsíců
 9. odčervení: ve stáří 12 měsíců

CO JE VAKCINACE A JAK FUNGUJE?

Vakcinace je jedním z nejzásadnějších kroků, které můžete udělat pro ochranu zdraví vašeho psa. Stejně jako u lidí i u psů hraje očkování klíčovou roli v prevenci mnoha nebezpečných a často i smrtelných chorob.

Co je vakcinace a jak funguje?

Vakcinace, neboli očkování, je proces, při kterém je do těla psa vpravena malá, neškodná dávka oslabeného nebo usmrceného viru či bakterie. Tato dávka nevyvolá onemocnění, ale „**naučí**“ **imunitní systém psa rozpoznat a bojovat proti danému patogenu**, pokud by se s ním v budoucnu setkal. Vytvoří se tak ochranné protilátky, které jsou připraveny rychle zasáhnout.

Vakcíny dělíme na základní, povinné a doporučitelné.

ZÁKLADNÍ OČKOVÁNÍ

- **Psinka** (D – distemper)
- **Parvoviróza** (P – parvovirus)
- **Infekční hepatitída** (A – adenovirus nebo H – hepatitis)
- **Parainfluenza** (Pi – parainfluenza)
- **Leptospiróza** (L – leptosirosis)

POVINNÉ OČKOVÁNÍ

- **Vzteklina** (R – rabies)

DOPORUČITELNÉ

- **Tetanus (T)** se doporučuje zejména u štěňat, která se pohybují v lese, u hospodářských zvířat a koní. Po první vakcinace se musí převakcinovat za 3–4 týdny a poté jednou za 2 roky. Aplikuje se do svalu.
- **Psincový kašel (KC)** je vhodný zejména při návštěvách společných akcí – cvičáků, výstav, psích hotelů a školek a míst s vyšší koncentrací psů. Vakcinuje se každý 1 rok a aplikuje se na sliznici nosu.

PROČ ODČERVOVAT?

Odčervení psů a koček patří k základním chovatelským úkonům. Pravidelným odčervováním chráníme nejen své mazlíčky, ale i sebe – mnoho vnitřních parazitů je totiž přenosných na člověka.

! Odčervení je třeba provádět s týdenním odstupem od vakcinace.

U štěnat a koťat je až 95% pravděpodobnost, že budou nakažena vnitřními parazity, nejčastěji škrkavkou (*Toxocara canis*). K nákaze dochází už v době březosti feny přes placentu a později také mlékem při kojení.

Škrkavky uvolňují neurotoxin askaridin a mohou způsobovat obstrukce trávicího traktu. U tzv. „začervěného“ zvířete se často objevují:

- zažívací problémy (průjem, zvracení, nechutenství),
- zpomalení růstu,
- dýchací potíže (např. kašel),
- neurologické příznaky (křeče),
- a v krajním případě i úhyn.

Tasemnicí (*Dipylidium caninum*) se může štěně nakazit při pozření blechy – například při sání mléka.

Oba paraziti jsou běžně přítomní ve vnějším prostředí a jejich vajíčka jsou velmi odolná.

Tento protokol je obecný – vždy se řiďte konkrétními pokyny, které vám sdělí ošetřující lékař.