

Typ močového kamene: **OXALÁT, ŠŤAVELAN, KALCIUM-OXALÁT**

Charakteristika:

Tvoří přibližně 40–50 % všech močových kamenů. Jsou způsobeny zvýšeným vylučováním vápníku nebo šťavelanů do moči. Není možné je rozpustit a jediným řešením bývá chirurgické odstranění. Následně **je nutno dodržovat zásady vedoucí ke snížení rizika opětovného výskytu**, protože až u 30 % pacientů dochází do 2 let k recidivě.

Plemenná predispozice: knírač malý, jorkšírský teriér, lhasa apso, pudl, shih-tzu, maltézský psík

Cíl: Snížit riziko návratu močových kamenů pomocí vhodné diety, pitného režimu a chovatelských opatření.

Obecné zásady		
Doporučení		Poznámka
Zvyšte příjem vody	60ml/kg hmotnosti a 24 hod.	ml/den
Zvyšte četnost venčení	optimálně by neměl být interval delší jak 6 hodin	
Udržování optimální váhy		nadváha ano / ne
Pravidelná kontrola moči	dle doporučení lékaře	

Dietní opatření:

- vyrovnaná a stabilní krmná dávka s přidavkem vody a vlhčeného krmiva,
- nepodávejte žádné minerální doplňky,
- vhodné krmení má nízkou hladinu bílkovin a sodíku a optimální hladinu fosforu.

Povolené domácí suroviny: vařená kuřecí stehna, vařená rýže, vařené vejce, řepkový olej

Zakázané potraviny: ovoce a zelenina, ořechy, pečivo, sardinky a losos, tofu, sójové boby

Doporučené komerční diety:

- ☐ Specific CKD Heart/Kidney support
- ☐ Farmina Vet Life – Oxalate canin
- ☐ Purina Pro Plan VD Urinary Ox/St Canine
- ☐ Royal canine VD Canine Urinary S/O
- ☐ Hill's C/D multicare Canine

Doporučení lékaře		Pozn.
Podávejte vitamín B6	(Pyridoxin 2–4 mg/kg)	☐ ½ tbl malý pes ☐ 1 tbl velký pes
Pravidelné vyšetření moči	1× za 1–3 měsíce	Datum:
Pravidelné USG případně RTG vyšetření	1× za 6–12 měsíců	Datum:
Sledované parametry v moči	hustota < 1 020, pH 6,5–8,0	